

10  
2013

# Newsletter č. 9



## Česká gastroenterologická společnost Česká lékařská společnost JEP

Vážení a milí kolegové a kolegyně,

rád bych Vás pozval na letošní hlavní akci naší odborné společnosti – 5. kongres České gastroenterologické společnosti. Akce proběhne ve dnech 7.–9. 11. v hotelu Thermal v Karlových Varech.

Bloky postgraduálních přednášek budou ve čtvrtek zaměřeny na problematiku kolorektálního karcinomu, terapeutické endoskopie a ulcerózní kolitidy. Pátek bude věnován endoskopickým výkonům, nespecifickým střevním zánětům a motilitě. Sobotní program bude věnován atraktivní problematice krvácení do zažívacího traktu.

Ve spolupráci s hepatologickou společností byl vytvořen postgraduální blok zaměřený na tuto oblast, součástí kongresu bude nově monotematická konference zaměřená na hepatocelulární karcinom.

Náplní kongresu však nebudou pouze odborná témata. Kongres bude i společenskou událostí a večer bude řada příležitostí k relaxaci. Doufáme, že se Vás podaří vytrhnout z mírně pochmurné listopadové nálady.

Každý večer bude probíhat řada společenských akcí.

Uvítací recepce pro všechny účastníky kongresu proběhne ve čtvrtek 7. 11. 2013 od 19:30 v prvním patře hotelu Thermal.

Součástí večera bude **koncert Vladimíra Mišíka** od 20:30 v Kongresovém sále.

A protože hotel Thermal je výborně vybaven promítací technikou, v pátek 8. 11. 2013 proběhne od 18:00 ve Velkém sále hotelu Thermal **promítání filmu**, který bude zvolen dle Vašeho výběru.

**Hlasování probíhá na:**

<http://www.gastrokongres2013.cz/spolecensky-program/film/>

**Na výběr jsou následující filmy:**  
Argo, Ve stínu, Nespoutaný Django

**Těším se na Vaši hojnou účast  
Váš doc. MUDr. Radan Keil Ph.D.**

### VLADIMÍR MIŠÍK



Vladimír Mišík (\*1947) je jednou z nejméně známých osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Český rockový zpěvák, skladatel, textař, svými spoluhráči a přáteli už léta mírně ironicky, avšak právem přezdívaný „Legenda“. Svou tvorbou

ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC však začali vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. Do roku 2007 vydal Vladimír Mišík & ETC 10 řadových alb a několik dalších kompilací.

7.–9. 11. 2013 | 8. 11. 2013  
HOTEL THERMAL – KARLOVY VARY  
WWW.GASTROKONGRES2013.CZ

**TĚŠÍME SE NA VÁS!**

5. KONGRES ČESKÉ  
GASTRO  
ENTERO  
LOGICKÉ  
SPOLEČNOSTI

HEPATOCELULÁRNÍ  
KARCINOM  
2013

# Oslavujeme 10 let

## od registrace přípravku HUMIRA® v Evropě a 10 let od uvedení na trh v České republice.

Přípravek HUMIRA® má více než 16 let zkušeností z klinických studií, počínaje studiem středně těžké až těžké revmatoidní artritidy, které byly zahájeny v roce 1997.<sup>1</sup>



**BIOLOGICKÁ  
LÉČBA**

**HUMIRA**  
adalimumab

### HUMIRA® Adalimumab. Zkrácená informace o léčivém přípravku

**Složení:** 0,8 ml injekčního roztoku obsahuje 40 mg adalimumabu. **Indikace:** Autoimunní onemocnění u pacientů, u nichž odpověď na konvenční léčbu nebyla dostatečná, kteří je netolerují, nebo je u nich z jiných příčin kontraindikována. **Revmatoidní artritida:** středně těžká až těžká aktivní RA dospělých, jestliže odpověď na DMARDs včetně methotrexátu není dostatečná a u těch, kteří nebyli v minulosti methotrexátem léčeni. Přípravek je možné podávat v monoterapii. **Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida:** léčba aktivní juvenilní idiopatické artritidy u dospívajících ve věku 2 až 17 let. **Axiální spondylartritida:** Axilární spondylartritida bez radiologického příznaku AS\* léčba dospělých pacientů s těžkou spondylartritidou bez radiologického příznaku AS, ale s objektivními známkami zánetu (zvýšené CRP a/nebo známky na MRI). **Psoriatická artritida:** aktivní a progresivní psoriatická artritida dospělých. U přípravku Humira bylo prokázáno snížení rychlosti progresse poškození periferních kloubů a zlepšení fyzických funkcí. **Psoriáza:** středně těžká až těžká chronická ložisková psoriáza. **Crohnova choroba:** 1) **dospělí pacienti:** středně těžká až těžká aktivní Crohnova choroba. 2) **pediatrickí pacienti:** léčba těžké aktivní Crohnovy choroby u pediatrických pacientů (6 až 17 let), u kterých reakce na konvenční léčbu, včetně nutriční léčby, kortikosteroidů nebo imunosupresiv nebyla dostatečná, nebo ji netolerují či je u nich tato léčba kontraindikována. **Ulcerozní kolitida:** středně těžká až těžká aktivní ulcerózní kolitida u dospělých pacientů. **Dávkování:** **Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida:** U dětí od 2 do 12 let se doporučuje dávka 24 mg/m<sup>2</sup> tělesného povrchu až do maxima 20 mg (u dětí od 2 do 4 let věku)\* a 40 mg (u dětí od 4 do 12 let věku)\*. Dávka se stanoví na základě výšky a hmotnosti pacienta. Děti od 13 let užívají dávku 40 mg. **Crohnova choroba: Děti do 40 kg hmotnosti:** počáteční dávka 40 mg, dále pak 20 mg subkutánně každý druhý týden. Při nutnosti rychlejšího nástupu odpovědi je možno podat 80 mg v týdnu 0 a 40 mg v týdnu 2, dále 20 mg každý druhý týden. **Děti nad 40 kg hmotnosti a dospělí pacienti:** počáteční dávka 80 mg, dále pak 40 mg subkutánně každý druhý týden. Při nutnosti rychlejšího nástupu odpovědi je možno podat 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2, dále 40 mg každý druhý týden. **Ulcerozní kolitida:**

počáteční dávka 160 mg v týdnu 0, poté 80 mg v týdnu 2 a dále se pokračuje dávkou 40 mg každý druhý týden. Pacienti, u nichž není odpověď na léčbu adekvátní, mohou profitovat ze zvýšení dávek na 40 mg každý týden. V průběhu udržovací léčby lze snižovat dávky kortikosteroidů. **Psoriáza:** Úvodní dávka 80 mg, následovaná dávkou 40 mg každý druhý týden, počínaje prvním týdnem po dávkě úvodní. **Ostatní indikace:** 40 mg adalimumabu subkutánně každý druhý týden. **Kontraindikace:** hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocné látky, aktivní tuberkulóza, jiné závažné infekce, středně těžké až těžké srdeční selhání. **Gravidita a laktace:** podávání adalimumabu v těhotenství se nedoporučuje. Během léčby a 5 měsíců po jejím ukončení nesmí ženy kojit. **Zvláštní upozornění:** Před zahájením léčby musí být všichni pacienti vyšetřeni na přítomnost tuberkulózy, u pacientů v minulosti léčených na tuberkulózu může dojít k její reaktivaci. Léčba přípravkem Humira může vést ke tvorbě autoimunních protilátek. V případě diagnózy latentní TBC musí být antituberkulózní léčba započata před zahájením léčby přípravkem Humira. TNF antagonisté, včetně přípravku Humira, ovlivňují imunitní systém a tím mohou ovlivňovat obranyschopnost organismu vůči infekci a rakovinovému bujení. U přípravku Humira byly také hlášeny fatální a život ohrožující infekce (sepsy, oportunní infekce, TBC). Byly také hlášeny závažné hematologické (pancytopenie), neurologické a autoimunní reakce (lupus erythematosus). U pacientů s Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou a polyartikulární JIA\* byl pozorován prudký pokles hladin CRP a snížení počtu buněk exprimujících markery zánetlivých faktorů v lústém střevě, včetně TNFα. Endoskopické zkoumání střevní sliznice prokázalo hojení sliznice u pacientů léčených adalimumabem. V souvislosti s podáváním antagonistů TNF se vzácně vyskytly případy nového vzniku nebo exacerbace symptomů demyelinizačního onemocnění, včetně roztroušené sklerózy, optické neuritidy\* a Guillain-Barré syndromu. **Interakce:** Protože byly při současném podání anakinry a etanerceptu pozorovány závažné infekce, nedoporučuje se podávat anakinru s antagonisty TNF. Není známo, zda léčba adalimumabem ovlivňuje riziko vzniku dysplázie nebo kolorektálního karcinomu. Pacienti s ulcerózní kolitidou, u nichž riziko dysplázie nebo karcinomu existuje, mají být na tuto možnost vyšetřeni.\* **Nežádoucí účinky:** Nejčastěji reakce v místě vpichu, infekce horních

cest dýchacích, kůže a uroinfekce, leukopenie, hypertenze, zvýšení jaterních enzymů, bolesti břicha, nevolnost, průjem, únava, bolesti hlavy, zvýšení lipidů, kožní vyrážka a bolesti svalů. Sporadicky byla hlášena neuropatie a závažné jaterní reakce, včetně autoimunní hepatitidy. U dospělých pacientů léčených současně azathioprinem/ merkaptopurinem byla pozorována vyšší incidence malignit a závažných nežádoucích účinků souvisejících s infekcemi.\* **Uchování:** v chladničce (2 - 8 °C), injekční stříkačku a předplněné pero lze také uchovávat při teplotě do maxima 25°C po dobu až 14 dní.\* **Chraňte před mrazem. Balení: pero:** 2 předplněná pera, 2 tampony napuštěné alkoholem, v blistru, **stříkačka:** 2 předplněné injekční stříkačky, 2 tampony napuštěné alkoholem, v blistru, **injekční lahvička:** 1 balení obsahuje 2 krabičky, každá obsahuje 1 ml lahvičku, 1 ml stříkačku, 1 injekční jehlu, 1 adaptér k lahvičce, 2 tampony napuštěné alkoholem. **Držitel rozhodnutí o registraci:** AbbVie Ltd., Maidenhead, Velká Británie. **Registrační čísla: pero:** EU/1/03/256/008, **stříkačka:** EU/1/03/256/003, **injekční lahvička:** EU/1/03/256/001. **Poslední revize textu:** 08/2013. Přípravek je vázán na předpis lékaře a je hrazen smluvním zdravotnickým zařízením z veřejného zdravotního pojištění pro indikace revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida, psoriatická artritida, psoriáza a Crohnova choroba.\* Vismněte si, prosím, změny v informacích o výrobku. *Seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku dítě, než jej předepíšete.*

**REFERENCE:** 1. SPC Humira, datum poslední revize textu: 08/2013. 2. Data on file. 3. Burmester GR, Panaccione R, Gordon KB, et al. Adalimumab: long-term safety in 23 458 patients from global clinical trials in rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, psoriasis and Crohn's disease. Ann Rheum Dis. 2013;72(4):517-524.

AbbVie s.r.o., Hadovka Office Park  
Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6  
Tel.: 233 098 111, fax: 233 098 100  
www.abbvie.cz

**abbvie**

HUM/06/12/09/00

# ELLA-CS



## Danis Seal



Jícnový vyjímatelný stent  
Léčba jícnových průsaků a perforací  
Optimální délka a expanzní síla  
Odolný silikonový potah  
Speciální anti-migrační design

ELLA-CS, s.r.o.  
Mílady Horákové 504,  
500 06 Hradec Králové

tel: +420 495 279 111  
fax: +420 495 265 655  
e-mail: info@ellacs.eu  
web: www.ellacs.eu



## OLYMPUS

Advancing the Art of Endoscopy...

### EVIS EXERA III



Bližší informace na [www.olympus.cz](http://www.olympus.cz).

## KALENDÁŘ DOMÁCÍCH AKCÍ

### Říjen

**XV. pražský pracovní podzimní gastroenterologický den – Refrakterní tvary onemocnění trávicího traktu**

Datum konání: 3. října 2013

Místo konání: Modrá posluchárna UK Praha

**20 let urgentní endoskopie ve FN Motol**

Datum konání: 22. října 2013 od 10.00 do 15.00

Místo konání: Fakultní nemocnice Motol

### Listopad

**5. kongres Gastroenterologické společnosti**

Datum konání: 7. až 9. listopadu 2013

Místo konání: Hotel Thermal, Karlovy Vary

**3. pankreatologický den IV. interní kliniky VFN a 1. LF UK Praha**

Datum konání: 27. listopadu 2013

Místo konání: IV. interní klinika VFN

**XVIII. moravský gastroenterologický den s onkologickou tematikou**

Datum konání: 29. až 30. listopadu 2013

Místo konání: hotel Kraví Hora, Bořetice

### Prosinec

**12. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry**

Datum konání: 5. až 6. prosince 2013

Místo konání: Kongresové centrum IKEM, Praha

## KALENDÁŘ DOMÁCÍCH AKCÍ 2014

**Pracovní den KAZUISTIKY 2014**

Datum konání: 27. února 2014

Místo konání: Modrá posluchárna UK Praha

**1st European Therapeutic Drug Monitoring Congress**

Datum konání: 28. až 30. srpna 2014

Místo konání: Diplomat Hotel Prague

**ESGE Live Demonstration 2014**

Datum konání: 12. až 13. září 2014

Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague

**13. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny**

Datum konání: 4. až 6. prosince 2014

Místo konání: Hotel Thermal, Karlovy Vary

## ČLENSTVÍ

Evidence členů ČLS JEP i jejich jednotlivých odborných společností se vede centrálně v sekretariátu ČLS JEP. Zájemce o řádné členství v ČLS JEP i v odborných společnostech musí vyplnit „Příhlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně“ a předá/zašle ji předsedovi odborné společnosti k projednání výboru odborné společnosti.

**On-line přihláška k dispozici [ZDE](#).**